

SVØMMEÆNDER

- Gråand
- Krikand
- Spidsand
- Pibeand
- Atlingand
- Knarand
- Skeand

Gråand

Gråand han

- Grønt hoved.
- hvid halsring
- blå vingespejl med hvidt bånd på begge sider af spejlet



Gråand hun

- Varm brun isprængt mørke aflange pletter.
- Hovedet, mørkere strøg fra næbbet bagud gennem øjet.
- Kendes fra andre svømmeænders hunner på de oftest orange partier på næbbet.
- blå vingespejl med hvidt bånd på begge sider af spejlet



Gråand fakta

Vægt: 850-1.400 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 9-13 æg

Antal kuld: 1

Yngleforhold: Almindelig ynglefugl i Danmark

Fødevalg: lever især af frø og grønne vandplanter, men tager også agern, byg fra en nyhøstet kornmark

jagtfakta

- ▣ Træffes i søer, moser og fiskeriterritoriet
- ▣ Der nedlægges årligt ca 500.000
- ▣ Eneste andefugl der må udsættes – dog i begrænset omfang – 1 ælling pr 150 m² eller 1 voksen and pr 300 m² åben vandoverflade
- ▣ Må handles





© Kirsten Hjørne

Krikand

Krikand han

- brunt hoved med tydeligt, bredt, grønt bånd fra foran øjet mod nakken
- Grå krop, gullig undergump
- Grønt vingespejl



Krikand hun

- Varm brun
isprængt mørke
aflange pletter
- Grønt vingespejl



Krikand fakta

Vægt: 250-400 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 8-11 æg

Antal kuld: 1

Yngleforhold: Yngler fåtalligt over det meste af Danmark

Fødevalg: Om sommeren lever krikanden især af insektlarver, muslinger og snegle. Om vinteren lever den derimod af planteføde.

jagtfakta

- ▣ Mest udbredt i træktiden i hele landet
- ▣ Yngler dog i næringsfattige vådområder i jylland
- ▣ Der nedlægges årligt ca 60.000
- ▣ Må handles





Spidsand

Spidsand han

- Grønlig-brunt vingespejl
- Kastaniebrunt hoved tydeligt hvidt bryst og hals
- Karakteristisk spids hale



Spidsand hun

- Varm brun spættet
- Slankere end
gråand
- Karakteristisk spids
hale



Spidsand

Vægt: 600-1.000 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 7-9 æg

Antal kuld: 1


Yngleforhold: fåtalligt på kystlokaliteter som strandenge, strandsumpe og små holme, særligt i de sydlige dele af landet og langs den jyske vestkyst

Fødevalg: vandplanter og smådyr

Jagtfakta

- ▣ Træffes primært som trækfugl i efteråret i vadehavsregionen. Yngler i DK i strandenge
- ▣ Der nedlægges årligt ca 5.000





© Kirsten Hjeltnes

Pibeand

Pibeand han

- Tydeligt hvidt felt på oversiden af vingen
- Brunt hoved med gullig pandeblis
- Hvid underside
- Blåt næb



Pibeand hun

- Rødbrun med lidt mørkere overside
- Juvenilt pjusket hoved



Pibeand (Brunnakke)

Vægt: 500-900 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 8-9 æg

Antal kuld: 1

Yngleforhold: yngler ikke i Danmark

Fødevalg: vandplanter og græs

Jagtfakta

- ▣ Træffes som trækgæst i efterårs- og vintermånederne primært i fiskeriterritoriet. Særligt Vadehavsområdet
- ▣ Der nedlægges årligt 30.000-50.000.



atlingand

Atlingand han

- matgrønt vingespejl omkranset af hvide felter.
- Hvidt bånd fra øje mod nakke
- Brunt bryst
- Lysgrå bug
- Gråblå forvinge



Atlingand hun

- matgrønt
vingespejl
omkranset af hvide
felter.
- Mørk brun
isprængt mørke
aflange pletter
- Hvid kindplet



HAN I FLUGT



HUN (VINGE)





Knarand

Knarand han

- Hvidt vingespejl
- Sort undergump
- Grå krop
- Sort næb
- Rustbrune pletter på forvinge



Knarand hun

- Hvidt vingespejl
- Gult næb





skeand

Skeand han

- Grønt spejl med hvidt bånd ovenover, samt blå felt på overvingen
- Sort hoved
- Hvidt bryst
- Sort hoved
- Skeformet næb



Skeand hun

- Grønt spejl med hvidt bånd ovenover
- Varm brunlig med større felter af sort i fjerdragten
- Skeformet næb









