

**GNAVERE
&
STØTTETANDEDE**

GNAVERE OG STØTTETANDEDE

- Hare
- Vildkanin
- Egern
- Bæver
- Sumpbæver
- Bisamrotte

Hare

- Gråmeleret pels
- Lange øre med sorte ørespidser
- Oversiden af halen er sort
- Bagløb væsentligt længere end forløb



HARE FAKTA

- Vægt 4 kg
- Udbredt og yngler i hele DK
- Foretrækker landbrugsarealer, men træffes også i skove
- Polygam. Yngler fra februar til August.
Drægtig i 42 dage, 2-4 kuld årligt af 2-3 killinger
- Ramler (han), sætter (hun), killinger (afkom)
- lever af friske skud af græs, urter og afgrøder

Vildkanin

- Lysebrun med halvlange øre
- Forløb og bagløb næsten lige lange
- Helt sorte øjne



VILDKANIN KANIN

- Vægt 1-2 kg
- Udbredelse Sønderjylland, Bornholm, småtøerne og flere småøer, lever i kolonier. Stammer fra udsætninger
- Foretrækker landbrugsarealer og mosaiklandskab
- Polygam. Yngler hele året. Drægtighed 28 dage, 3-4 kuld årligt. 2-10 killinger pr. kuld.
- Lever af friske skud af græs, urter og afgrøder
- Rammes ofte af sygdommen myxomatose

Egern

- Pelsen varierer fra rød til næsten sort
- hals, bryst og bug er hvid
- pjusket hale, der er ligeså lang som kroppen
- Korte forløb



Bæver

- Ensfarvet mørkebrun pels.
- lange skarpe fortænder
- bred, flad, skællet hale.



Sumpbæver

- Brunlig pels med grove dækhår
- Rund hale med kort pels



Bisamrotte

- Brunlig pels
- lys på kæbe og hals
- Rund, skællet hale der er næsten ligeså lang som kroppen

