

ROVDYR

ROVDYR

- Ræv
- Mårhund
- Vaskebjørn
- Grævling
- Skovmår
- Husmår
- Ilder
- Mink
- Odder
- Spættet sæl
- Gråsæl

Ræv

- Pelsen varierer fra helt lys orangebrun til mørkerød – i nogle tilfælde næsten sort.
- Snude hals og bug er oftest næsten hvid
- Halespidsen ligeldes ofte hvid
- Bagsiden af ørerne er sorte




RÆV FAKTA

- Udbredt overalt i DK, muligvis fraset Bornholm
- Vejer 6-10 kg
- Parringstid januar-februar. Drægtig 52-53 dage. Der sættes 4-6 hvalpe i marts-april
- Kan adaptere til alle habitater. Stort set altædende
- Må jages og reguleres

Spor fra ræv og hund

Rævespor



Du kan tegne en
streg mellem
rævens trædepuder

Hundespor



Der er ikke plads til
at tegne streg mellem
hundens trædepuder

Mårhund

- Sort underpels med lange grove grå og brune dækhår.
- De oftest grå dækhår fortsætter frem foran ørerne ned i pande således kæber fremstår bartede.
- Ansigtet under øjnene er mørkt, og ligner en maske der deles af den hvide snuderyg



FAKTA

- Invasiv art der træffes i hele Jylland og på fyn
- Vejer typisk 4-7 kg
- Monogam. Der sættes i snit ca. 8 hvalpe i forårs månederne
- Fortrækker vådområder, men træffes i alle habitater
- Har jagttid
- Må reguleres hele året (invasiv)

Vaskebjørn

- Lange grå pelshår
- Ansigtet ses med tværgående mørkt bånd, der gennemløber øjnene, i et ellers hvidt ansigt.
- Halen er lys med tværgående grå striber.



Grævling

- Gråhvide dækhår på sort underpels. Fremstår derfor grålig
- Kompakt krop og korte ben
- Hvidt hoved med sorte striber fra snude gennem øje og øre mod nakke/ryg



Skovmår

- Mørk brun pels og mørkbrun hale på ca. halvdelen af kropslængden
- Gullig halstegning



Husmår

- Mørk brun pels og mørkbrun hale på ca. halvdelen af kropslængden
- Hvid halstegning



FAKTA

- Udbredt over hele DK, fraset Bornholm
- Parringstid midt juli. Har forlænget drægtighed. Der sættes 2-3 hvalpe marts-april.
- Lever af fugle, mindre gnavere, samt æg og yngel
- Primært skumrings-, og nataktiv.

Ilder

- Mørk aftegning omkring øjnene. Ligner en maske på et ellers hvidt ansigt. Masken kan dog være udvisket da ansigtet kan have samme mørke brune farve som dækhårerne.
- Underulden er meget lys, og ilderen synes derfor at fremstå nærmest havskaldet på kroppen.



Mink

- Mørke dækhår samt mørk underpels.
- Fremstår ensfarvet



FAKTA

- Udbredt i hele DK som følge af udslip fra minkfarme
- Dagaktiv, holder til i vådområder
- Yngler i DK
- Har forlænget drægtighed . Får 4-6 unger i april-maj måned
- Lever af fisk, padder samt æg yngel og voksne fugle
- Må jages og reguleres (invasiv)

Lækat

- Rødbrunt ansigt, hoved, ryg og hale
- hvid hage, hals, ben og poter
- Sort spids på hale
- Helt hvid i vinterpels, hvor den benævnes hermelin.



Odder

- Mørkebrun pels med gråbrun underuld
- Hals og bryst fremstr ofte lys grå.
- Meget små ører
- Smømmehud mellem tæerne
- Kraftig halerod
- Halen måler ca. halvdelen af kropslængden (totale længde kan nærme sig 1.5 m)



Spættet sæl

- Gråbrunlig plettet pels
- Kort snude
- V-formede næsebor



Gråsæl

- Grå pels (hunnen noget lysere end hannen)
- Kegleformet snude med parallelt stillede let, fra hinanden, spredte næsebor.

