


Vildtpleje

Vildtpleje



Bestandpleje

- ▣ Fodring
- ▣ Udsætning
- ▣ Afskydning
- ▣ Regulering

Fodring

- ▣ Generelt gælder for fodring, at man skal have tid og ressourcer til at føre projektet til ende.
- ▣ Indstiller man sin fodring, vil vildtet sandsynligvis dø af sult.
- ▣ Begynder man sin fodring for sent på efteråret, vil vildtet ikke have mulighed for at vænne sig til det, og muligvis foræde sig i det udlagte foder.
- ▣ Fodring bør ske hvor der er god dækning.
- ▣ Foder der ikke ædes op hver dag, anbringes i fodertrug, helst overdækket.
- ▣ Generelt skal man være bevidst om at foderpladser kan øge smitterisikoen for vildtet.

Fodring af hjortevildt

- Kraftfoder (hjorteblandinger er dyre – og består oftest af det samme som kvægblandinger)
- Æbler sukkerroer, gulerødder
- Kornafgrøder: Majs, ærter, havre
- Stråfoder: hø, ensilage.
- **Undgå generelt at fodre råvildt**



Rådyr

GRUTFORGIFTNING

FODERAUTOMATER



Fodring af fuglevildt

- Fodervalg: byg, hvede (til krikænder raps) – husk at kråseflint skal være tilgængeligt for fuglene
- Fodring skal foregå på platforme eller i automater



UDSÆTNING AF VILDT

Udsætning af Hønsefugle

- Udsætning af fasaner må forgå i perioden 01.04-31.08, udsætning af agerhøns i perioden 01.04-15.08
- På ejendomme under 100 ha må udsættes max 100
- På ejendomme over 100 ha må udsættes 1 pr. ha
- På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer hvor der er udviklet biotopplan må udsættes 7 pr. ha
- I skov og mose må udsættes 7 pr. ha (skal dog indberettes til skov og naturstyrelsen)



Udsætning af gråænder

- Gråænder må udsættes i søer (hvor man selvsagt har ejendomsretten).
- Der må udsættes 1 kylling pr. 150 kvm. vandoverflade.
- Der må udsættes 1 voksen and pr. 300 kvm. vandoverflade.



AFSKYDNING

Afskydning af kronvildt

- Afskydning tilrettelægges, så bestanden har en naturlig køns- og aldersfordeling
- Afskydning bør foretages så den fordeler sig jævnt mellem han- og hundyr, og med størst afskydning af de helt unge dyr
- Bestanden bør ikke afskydes med mere end 1/5 af efterårsbestanden
- Begrænse septemberjagt på hjorte
- 1 stykke kronvildt pr. sæson pr. 25 ha
- Afhold ikke tryk-og drivjagter i september måned
- Skyd ikke diegivende hinder i oktober
- Afhold højst 3-4 fællesjagter pr. sæson på samme revir (der bør forløbe mindst 3 uger mellem disse)
- Begræns brugen af store hurtiggående hunde til drivjagt



Afskydning af råvildt

Råvildt kan på de terræner, hvor bestanden er i balance med bæreevnen, tåle en afskydning på ca. 1/3 af det antal dyr, som er i efterårsbestanden

- Normal afskydningsmodel for en dansk råvildtbestand i balance med områdets bæreevne er:
 - 50% lam
 - 50% voksne, fordelt med 30% bukke og 20% råer



Afskydning af andefugle

- Jagt på trækkende ænder skal ikke drives oftere end hver 3. eller 4. uge
- På udsatte andefugle kan det moralsk accepteres, at der skydes lidt oftere.



Afskydning af fasaner

- Da fasaner er polygame er det i praksis nok ikke muligt at skyde for mange kokke
- Derimod bør der udvises en vis tilbageholdenhed i forhold til afskydning af høner
- Da de fleste fasaner er udsatte fugle kan det moralsk accepteres at drive jagt på disse lidt oftere
- Hvor fasaner på størreejendomme udnyttes kommercielt i forbindelse med jagtvæsen, kan man vissesteder få ca. 50% af de udsatte fugle udnyttet



Afskydning af agerhøns

- Det kan biologisk forsvares at nedlægge 40% af efterårets bestand af agerhøns
- Moralsk kan det ikke accepteres at skyde til agerhøns under syv i flok
- Med hensyn til jagt på udsatte agerhøns, vil man sjældent kunne udnytte agerhønsene med mere end 25%



Afskydning af gæs

- Jagt på gæs bør om muligt drives mellem overnatnings- og fourageringsplads . Der bør underingen omstændigheder skydes på overnatningslokaliteten.
- **Ønsker man at skyde i fourageringsområdet bør der:**
 - altid være marker omkring, hvor gæssene kan æde uforstyrret
 - Ikke drives jagt den første uge gæssene er på stedet.; og det givne sted højst hver 14.dag.
 - Generelt bør jagterne arrangeres på dage hvor der er regn og blæst, da gæssene forstyrres mindst af jagten under disse forhold



Regulering

- ▣ Kødædende arter som ræv, husmår, krage og huskade er ønskværdigt at begrænse individantallet .
- ▣ Ræv, krage og huskade efterstræbes ved beskydning på jagt – men kan også reguleres ved fældefangst
- ▣ Husmår, ilder, mink, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte og sumbæver reguleres ved fældefangst.

TERRÆNPLEJE

Direkte tærrenpleje

- Den direkte terrænpleje omfatter grundlæggende én ting:

Vildtplantning

Vildtplantning

- Forbedrer de fysiske rammer for vildtet, ex. ved at skabe skjul for vildtet, samt sikrer ynglesteder for vildtet.
- Gavner ligeledes agerlandets øvrige dyr, fugle, padder, krybdyr, insekter og vilde planter.
- Vildtplantning skaber hvert år ca. 300 ha ny natur.

Levende hegn

- Skal minimum være 3 rækker bred. Med en plante- og rækkeafstand på 1.5 meter.
- 75 % af planterne bør være buske, kun 25 % egentige træer.
- Skyggetålende arter plantes i nordsiden.
- Vindstærke arter plantes mod vest.



Den lille vildtplantning

- Denne vildtplantning er ofte under 1000 m²
- Bør primært bestå af buske
- Vil ofte findes omkring mergelgrave



Den store vildtplantning

- Ideel placering for denne , er i forlængelse af vandhul.
- Undgå høje løvtræer omkring vandhullet, da de skygger og kaster blade i vandet.
- Generelt bør sydsiden kun tilplantes sparsomt.
- Af hensyn til vinterdækning bør vildtplantningen indeholder en eller flere kerner af nåletræer.



Plantninger i det åbne land

- ▣ Plantning i arealer der er i dyrkning forudsætter en konstruktiv dialog med den enkelte landmand.
- ▣ Plantning i arealer der ikke er i dyrkning forudsætter ofte en tilladelse fra kommunen, da disse arealer i mange tilfælde er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelsesloven §3

- ▣ § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

- ▣ 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe samt 4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m² i sammenhængende areal.



Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

Der må som udgangspunkt ikke plantes nærmere end -

- 100 m fra fortidsminder
- 150 m fra registrerede vandløb og søer
over 3 ha
- 300 m fra stranden

Indirekte terrænpleje


- Vildtvenlig markdrift
- Udnyttelse af brakarealer
- Vildtvenlig skovdrift

Vildtvenlig markdrift

- ▣ Vildtvenlig landbrugsdrift er indirekte terrænpleje, hvor man i den daglige drift af en ejendom tager hensyn til vildtet. Nøgleordene er små marker, mange levende hegn, variation i afgrøderne, lange smalle agre og sprøjtefrie zoner og insektvolde.

Vildtvenlig høst

- Op til høst kan der opsættes skræmmemidler
- Inden høst kan marken afsøges af hund
- Under selve høsten bør høstmønstret sikre vildtet en flugtvej



Brakarealer

- ▣ Med EU's landbrugsreform i 1992 blev udtagning af landbrugsjord (braklægning) en ny mulighed for at tilgodese vildtets behov i det åbne land.
- ▣ Via dialog med landmanden kan brakarealerne spredes til kanter af marker der alligevel har lavt høstudbytte og som smalle striber langs hegn, skove, vandløb, søer og markskel.

Vildtvenlig skovdrift

- ▣ Et bredt sammensat udvalg af planter og bevoksninger i forskellige aldre.
- ▣ Lysåbne bevoksninger med undervegetation og buske.
- ▣ Brede skovbryn med masser af buske, der adskiller skoven fra de omkringliggende åbne arealer.
- ▣ Ubevoksede arealer, der fremstår som skovenge, heder, lysninger mv., hvor der findes gode fødemuligheder.