

VADEFUGLE

- Strandskade
- Vibe
- Hjejle
- Strandhjejle
- Stor regnspove
- Lille regnspove
- Lille kobbersneppe
- Stor kobbersneppe
- Rødben
- Sortklire
- Hvidklire
- Islandsk ryle
- brushane
- Dobbeltbekkasin
- enkeltbekkasin
- Skovsneppe

VADEFUGLE GENERELT

- Søger ofte føde ved kyster eller vådområder, hvorfor de i DK har gode betingelse og ofte ses i store flokke om efteråret, hvor de er på vej sydover til deres ynglesteder
- Effektiv dræning af landbrugsjord har betydet stor nedgang i vadefugle gennem det sidste århundrede
- De fleste vadefugle lægger kun 4 æg i det ene årlige kuld. Derfor har de været sårbare overfor jagt.
- Kun dobbeltbekkasin og skovsneppe har jagttid
- Lever fortrinsvist af orme og snegle

STRANDSKADE

strandskade

- Hoved, bryst og overside sort
- Underside samt bagside af overvinge hvid
- Langt lige rødt næb
- Røde øjne
- Røde ben



VIBE

Vibe

- Tydelig mørk top
- Overside chancerer i blå/ grønne nuancer
- Bryst og hals sort
- Hvid bug
- Kort, mørkt næb



Hjejle

Hjejle

- Gul og sortspættet overside samt sort underside brudt af hvidt fra næbrod til hale set lateralt fra
- Hvide armhuler



HJEJLE

- Vægt: 140-210g
- Ynglealder: 1 år
- Antal æg: 4
- Yngleforhold: Sjælden ynglefugl i DK.
- Fødevalg: insekter, orme, snegle og bær.

STRANDHJEJLE

strandhjejle

- Hvid overside i sprængt sorte pletter samt sort underside brudt af hvidt fra næbrod til hale set lateralt fra
- Sorte armhuler



HJEJLE



STRANDHJEJLE



Stor regnspöve

Stor regnspove

- Langt nedadbøjet næb
- Lange ben
- Lang hals
- Brun fjerdragt med sorte længdestriber



STOR REGNSPOVE

- Vægt: 575-950g
- Ynglealder: 2 år.
- Kuldstørrelse: 4 æg
- Yngleforhold: Yngler kun i fåtal i DK
- Fødevalg: sandorm, snegle, insektlarver, krebsdyr, muslinger og endog bær.

LILLE REGNSPOVE

Lille regnspove

- Langt nedadbøjet næb
- Brun fjerdragt med sorte længdestriber
- Mørk stribе fra næbrod til øje
- Kortere hals end Stor regnspove



LILLE KOBBERSNEPPE

Lille kobbersneppe

- Langt let opadbøjet næb
- Vinterdragt rød
- Sommerdragt grå



STOR KOBERSNEPPE

Stor kobbersneppe

- Langt let opadbøjet næb
- Vinterdragt rød
- Sommerdragt grå
- Hvidt vingebånd, der kun ses i flugt



LILLE KOBBERSNEPPE



STOR KOBBERSNEPPE



RØDBEN

Rødben

- Grå med lysere bug og bryst
- Røde ben
- Lige halvlangt mørkt næb, rødligt ved basis
- Hvid bagvinge (hvorved den kan kendes fra sortklire i vinterdragt)



SORTKLIRE

Sortklire

- Sommerdragten er sort med sorte ben
- Vinterdragt er hvid med røde ben. Kun undernæb er rødt ved næbroden.
- Bugen hvid i vinterdragt.



SORTKLIRE FLUGT



RØDBEN FLUGT



HVIDKLIRE

Hvidklire

- Grå overside, hvid underside
- Let opadbøjet næb
- Grønne ben
- Kan adskilles fra sortklire i vinterdragt og rødben på de grønne ben og det let opadbøjede næb



ISLANDSK RYLE

Islandsk ryle

- Stor byttet gråsort fugl med korte ben
- Underside er i efterårsdragt lys rustfarvet , i vinterdragt lys (gråhvid)
- Kort mørkt næb



BRUSHANE

Brushane

- Lille hoved på relativ kort hals
- Mørkt næb
- Lange ben
- Hannen har i yngledragt markant halskrave med mange farvevariantar



BRUSHANE PAR



BRUSHANE VINTERDRAGT



HAN I YNGLEDRAGT



HAN I YNGLEDRAGT



DOBBELTBEKKASIN

Dobbeltbekkasin

- Lyse og mørke længdestriber på hovedet
- Langt lige næb



DOBBELTBEEKKASIN FAKTE

- Vægt: 80-120g
- Ynglealder: 2 år
- Kuldstørrelse: 4 æg
- Yngleforhold: Arten yngler på våde enge og i moser i DK
- Fødevalg: orme, krebsdyr, snegle og diverse insekter

Dobbeltbekkasin flugt

Karakteristisk zig-zagflugt.



ENKELTBEEKKASIN

Enkeltbekkasin

- Lyse og mørke længdestriber på hovedet
- Ca. halv størrelse af dobbeltbekkasin
- Tydelige gule længdestriber på ryggen



enkeltbekkasin

Enkeltbekkasin der trykker



SKOVSNEPPE

Skovsneppe

- Brun vadefugl med tværgående mærkebrune felter på isse
- Langt lige næb
- Korte ben
- Meget kort hals



SKOVSNEPPE FAKTA

- Vægt: 250-420g
- Ynglealder: 2 år
- Kuldstørrelse: 4 æg
- Yngleforhold: Yngler i DK. Anlægger reder i skovbunden. Polygam.
- Fødevalg: Regnorme samt insekter og deres larver.
- Udpreget skovfugl. Primært nataktiv.